

쇄석 후 주의사항

- 1 기기에서 발생시킨 충격파가 체내 결석을 미세한 가루로 만든 후 소변으로 배출시키므로 반드시 하루에 3L 정도의 물을 섭취하여 결석 가루의 배출을 용이하게 해주는 것이 효과적입니다.
- 2 1주 내지 2주 간격으로 시술을 시행하는데, 이때에도 평소 가벼운 운동(줄넘기 등)으로 체외배출을 용이하게 해주는 것이 중요합니다.
- 3 시술 당일 배뇨시 혈뇨가 보이거나 통증이 오히려 심해질 수 있는데 이는 충격파에 의해 요관 및 신장의 점막이 부어 발생하는 현상이므로 차차 증세가 좋아지게 됩니다. 만약 심한 통증으로 인해 약을 먹어도 조절이 되지 않는 경우 저희 병원으로 문의해 주시길 바랍니다.
- 4 시술 후 요로감염을 일으키는 경우가 있습니다. 결석에 붙어 있던 세균들이 충격파에 의해 떨어져 나오면서 발열, 오한, 구역질과 함께 복통이 심해지는데 이러한 경우를 예방하기 위해 미리 항생제를 처방해 드리고 있지만 완전히 예방하기는 어렵습니다. 따라서 시술 후 귀가하신 다음에라도 이러한 증세가 심해진다면 언제든지 저희 병원으로 문의해주시고 방문하셔서 진료를 받으셔야 합니다.
- 5 통증이 나타나지 않아도 잔석이 남아있을수 있으니 신기능및 잔석여부 확인을 위해 내원일을 지켜주세요.

