

포경수술 후 주의사항

- 1 수술 후 출혈 및 혈종이 발생할 수 있으므로 1~2일 정도는 과한 운동이나 활동은 자제 하는게 좋고, 수술 1~2일 후 간단한 소독 및 환부 관찰을 위해 내원해 주시기 바랍니다.
- 2 수술 후 일정양의 출혈은 정상적으로 생길 수 있으나 거즈가 흠뻑 젖거나 속옷에 묻을 정도로 출혈이 많으면 병원으로 연락을 주시기 바랍니다.
- 3 수술 후 수일 동안은 발기 시에 통증이나 수술부위 근처에 멍이 생길 수 있는데 대부분 시간이 지나면서 호전됩니다.
- 4 수술 후 귀두 부분이 많이 붓거나 심한 경우 수포가 형성 되기도 합니다. 이럴때는 음경을 배꼽 방향으로 위로 향하게 하면 붓기가 빨리 가라앉습니다.
- 5 일반적으로 수술 후 7~14일 사이에 실을 제거 하게되고, 실밥 제거후부터 목욕을 하시는 것이 좋습니다.
- 6 수술 후 일주일 정도는 금주를 하는 게 좋고, 성관계는 실밥 제거 2주 후부터 가능합니다.

